

TRATAMIENTO DE DIARREA EN TERNEROS

Las diarreas en terneros, pueden tener diferentes causas: microbios, falta de higiene, exceso de leche, etc.



Preparación del suero casero para la rehidratación:

1 Litro
de agua
hervida



1 Cucharilla
de sal



1 Cuchara
de azúcar

Dar de beber el suero en una botella

¿CÓMO CURAR UN TERNERO CON DIARREA?

Durante
tres días



- No dar leche al ternero
- Sustituir la leche por suero casero
- Administrar un bolo de oxitetraciclina o sulfa

Para cuidar la flora bacteriana, utilizar antibióticos inyectables en terneros mayores a 7 semanas



LACTANTE (monogástrico)



ADULTO (rumiante)

Promover el desarrollo de bacterias que digieren el alimento en el rumen (flora bacteriana), que facilita el crecimiento del ternero y su paso de lactante a rumiante (animal adulto)

¿POR QUÉ SE PRESENTAN LAS DIARREAS EN TERNEROS?

Dejar de dar leche al ternero, porque ésta favorece la multiplicación de microbios en el intestino, empeorando la condición del ternero.

Reemplazar la leche por suero casero, que se prepara, en un litro de agua hervida, con una cucharilla de sal y una cuchara de azúcar. También se pueden utilizar sales de rehidratación oral que existen en el mercado (recomendable).

La cantidad de suero depende del peso, por ejemplo, un ternero de 30 kilos debe tomar 3 litros de suero. Puede tomar 1 litro por la mañana, 1 litro al mediodía y 1 litro por la tarde, así el ternero está hidratado y obtiene un poco de energía.

Por no haber tomado calostro y no tener defensas necesarias en su cuerpo.

Por no desinfectar el ombligo.

Por microbios patógenos que están en el medio (corral, forraje ó el agua).

Porque no se controla la cantidad de leche que toma el ternero.

Es necesario saber cuanto de leche produce la vaca, para dejar en la ubre la cantidad que debe tomar el ternero de acuerdo a su peso.

¿QUÉ HACER CUANDO EL TERNERO TIENE DIARREA?

La fiebre o calentura, es señal de infección, por tanto se recomienda tratar al ternero con un bolo de oxitetraciclina o de sulfa (vía oral) durante 3 días, si no mejoran las condiciones deberá llamar al Médico Veterinario.

No se recomienda tratamientos con antibióticos por vía oral a terneros mayores de 7 semanas, ya que se puede alterar la flora bacteriana del rumen. Es mejor utilizar el antibiótico por vía subcutánea o intramuscular.

¿CUÁNDO SE PUEDE UTILIZAR ANTIBIÓTICOS PARA CURAR DIARREAS?

Los terneros al nacer son monogástricos, durante el primer año desarrollan el rumen y se convierten en rumiantes.

Para que en el rumen desarrollen adecuadamente las bacterias que digieren la fibra, se recomienda el consumo temprano de concentrado, heno de calidad y evitar el consumo de antibióticos por vía oral.

¿POR QUÉ CUIDAR LA FLORA RUMINAL?

Ten cuidado con el uso de antibióticos en terneros

Fuente: Enfermedades del vacuno en explotación intensiva, 1991.

ALTAGRO, es un proyecto ejecutado por el Centro Internacional de la Papa.

PROYECTO
ALTAGRO
CIP - CIDA

• INTERNACIONAL •
• CENTRO •
• DE LA PAPA •
CIP